

Reloxan[®]

Při pálení žáhy

Žvýkácí tablety s příchutí máty, zdravotnický prostředek

Návod k použití

Žvýkácí tablety Reloxan[®] jsou zdravotnický prostředek pro rychlou a dlouhodobou úlevu od pálení žáhy a žaludečních potíží způsobených žaludeční kyselinou. Pro dospělé a dospívající od 12 let.

Opakující se žaludeční potíže způsobené kyselinou, jako pálení žáhy, kyselé říhání a neustálý tlak v žaludku, jsou nepříjemné a mohou se ve zvýšené míře vyskytovat např. ve stresových situacích nebo v důsledku konzumace určitých potravin nebo užívání léků.

Zde pomáhají **žvýkácí tablety Reloxan[®]**. Jedinečná kombinace pufrů minerálních kyselin (uhličitan vápenatý a uhličitan hořečnatý) a vysoce koncentrovaných ochranných rostlinných látek z opuncie působí proti potížím zapříčiněným žaludeční kyselinou hned dvojnásobem.

- Přebytečná žaludeční kyselina je rychle neutralizována. To vede k rychlé úlevě od akutních příznaků, jako jsou pálení žáhy a kyselé říhání. Narušená sliznice jícnu a žaludku je zároveň pokryta zklidňujícím ochranným filmem.
- Aktivní složky uhličitan hořečnatý, uhličitan vápenatý a extrakt z opuncie jsou uvolňovány již při žvýkání. Jsou tak přímo k dispozici v žaludku a mohou účinkovat okamžitě. Potíže pak rychle odezní.

Žvýkácí tablety Reloxan[®] je možno užívat již při prvních příznacích. Již jedna žvýkácí tableta neutralizuje přebytečnou žaludeční kyselinu a ihned zmírní pálení žáhy. **Žvýkácí tablety Reloxan[®]** jsou dobře snášeny a jsou dostupné s mátovou nebo ovocnou příchutí.

Co je to pálení žáhy a jak se léčí?

Pálení žáhy je většinou vnímáno jako pocit pálení v oblasti žaludku, který se může šířit vzhůru za hrudní kost. Je zapříčiněno přebytkem žaludeční kyseliny a zpětným tokem obsahu žaludku do jícnu. To může vést i k zánětu a bolesti v jícnu. Stres, nezdravé stravování a spěch při jídle jsou běžnými příčinami těchto potíží.

Dávkování a použití

Není-li doporučeno jinak, užívají dospělí a dospívající od 12 let dle potřeby 1 žvýkací tabletu. Dle potřeby lze brát vždy 1 žvýkací tabletu až 4x denně.

Žvýkací tablety Reloxan® se užívají ideálně jednu hodinu po jídle, dle potřeby také mezi jídly nebo před spaním. Žvýkací tablety je možno cucat nebo žvýkat. Účinky **žvýkacích tablet Reloxan®** a některých ústí podávaných léčivých přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat, užívejte proto **žvýkací tablety Reloxan®** s odstupem 1 až 2 hodin od těchto léků a informujte svého lékaře.

Doba používání by neměla být delší než 30 dní. V případě déle trvajících potíží se poraďte s lékařem. Během těhotenství a kojení se prosím poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Upozornění pro diabetiky: 1 žvýkací tableta obsahuje až 0,56 g sorbitolu. Použití nadměrného množství přípravku může mít projímavý účinek.

Upozornění a opatření pro použití

Užívání vysokých dávek po delší dobu by mohlo vést k potenciálně závažnému onemocnění, takzvanému milk-alkali syndromu (Burnettův syndrom). Tato nemoc bývá spojena s vysokou hladinou vápníku v krvi (např. hyperkalcemie), sníženou funkcí ledvin, v ojedinělých případech se zánětem slinivky břišní a může se projevovat jako časté močení, bolesti hlavy, nechutenství, nevolnost nebo zvracení, neobvyklá únava nebo slabost. Proto doporučujeme neužívat **žvýkací tablety Reloxan®** bez přerušení déle než 14 dní a neužívat více než 4 tablety denně. Je třeba se vyvarovat nadměrného užívání kalcia, zejména v případě výživy bohaté na vápník (např. mléko, smetana, sýr, jogurt, potravinové doplňky s vápníkem).

V případě užívání tiazidových diuretik (léky proti vysokému krevnímu tlaku nebo srdeční slabosti) se před použitím prosím obraťte na svého lékaře.

U obzvláště citlivých osob může mentol obsažený v mátovém oleji vyvolat přecitlivělou reakci (včetně dušnosti).

Kdy se žvýkací tablety Reloxan® nesmí užívat?

- V případě přecitlivělosti nebo alergie na mátový olej nebo kteroukoli z obsažených látek
- V případě dědičné fruktózové intolerance
- U dětí a dospívajících mladších 12 let
- V případě ledvinových potíží (např. ledvinové kameny, poruchy funkce ledvin)
- Při nadměrné koncentraci vápníku v krvi nebo moči
- V případě příliš nízké hladiny fosfátů v krvi

Velikosti balení

K dispozici jsou balení s 8 (neprodejný vzorek), 16 nebo 48 žvýkacími tabletami.

Složení

1 žvýkácí tableta obsahuje: uhličitan vápenatý 450 mg, uhličitan hořečnatý 50 mg, extrakt z opuncie 75 mg, sorbitol, kukuřičný škrob, maltodextrin, mátový olej, magnesium-stearát.

Žvýkácí tablety Reloxan® neobsahují žádné konzervační látky nebo umělá barviva. Bez lepku. Bez laktózy.

Uchovávejte v chladu a suchu, chraňte před horkem a světlem. **Uchovávejte mimo dosah dětí.** Datum použitelnosti na obalu a na blistru se vztahuje na řádně uchovávaný výrobek.



Použitelné do: viz krabička, resp. blistr

Aktualizace: 2022-01

Aktualizace návodu k použití = aktualizace originálního textu = RRRR-MM



Výrobce:
HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
D-23562 Lübeck



Distribuce:
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
www.schwabe.de



0482 *Minimální velikost 5 mm*

Poznámky:

Dostupné velikosti balení:

- 8 kusů „neprodejný vzorek“
- 16 kusů
- 48 kusů

Možné obchodní názvy:

- Reloxan → EU mimo Německo
- Refluctan → Švýcarsko, EU mimo Německo a Itálii
- Reloxan → EU (ve stadiu zkoušení), možný pro Německo
- Refluctin → EU (ve stadiu zkoušení)
- Reflucthin → EU (ve stadiu zkoušení)
- Benoflux → EU (ve stadiu zkoušení)
- Rifludio → Itálie (ve stadiu zkoušení)
- Rifluguard → EU (ve stadiu zkoušení)
- Reflulless → EU (ve stadiu zkoušení)